



**„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ  
HASCO-LEK” S.A.  
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E**

Tekst etykiety opakowania zewnętrznego

**ULGIX WZDĘCIA MAX**  
kapsułki miękkie  
(*Symetykon*)

.....kapsulek  
Wyrób medyczny

Silne wzdęcia  
Uczucie pełności  
Odbijanie

**Skład**

1 kapsułka żelatynowa zawiera:

240 mg symetykonu

Substancje pomocnicze: żelatyna, glicerol, żółcień chinolinowa

**Co to jest wyrób medyczny Ulgix Wzdęcia Max i dlaczego się go stosuje**

Ulgix Wzdęcia Max zawiera symetykon w wysokiej dawce. Dzięki temu zwiększa się efektywność działania preparatu, co wpływa na skuteczniejsze łagodzenie dolegliwości wywołanych przez silne wzdęcia. Zalecana dawka symetykonu wywołuje wyłącznie działanie powierzchniowe i jest obojętna dla organizmu.

Symetykon posiada zdolność obniżania napięcia powierzchniowego śluzu i pęcherzyków gazów znajdujących się w jelitach. W ten sposób ułatwia usuwanie nadmiaru nagromadzonych gazów w przewodzie pokarmowym i łagodzi wzdęcia nawet znacznego stopnia.

Ulgix Wzdęcia Max stosowany jest:

- do łagodzenia objawów związanych z nadmiernym nagromadzeniem gazów w jelitach, takich jak: uczucie pełności, silne wzdęcia, odbijanie
- w celu usunięcia gazów i powietrza przed wykonaniem badań diagnostycznych w obrębie jamy brzusznej, dla poprawy jakości obrazów uzyskiwanych techniką radiologiczną, ultrasonograficzną i endoskopową

**Ważne informacje przed zastosowaniem wyrobu medycznego Ulgix Wzdęcia Max**

Wyrobu nie należy stosować, jeśli występuje nadwrażliwość na symetykon lub inny składnik wyrobu.

Stosowanie wyrobu w okresie ciąży i karmienia piersią wymaga konsultacji lekarskiej.

## **Instrukcja dotycząca stosowania wyrobu medycznego Ulgix Wzdęcia Max**

Wyrób w postaci kapsułek żelatynowych stosuje się doustnie.

*Objawy związane z nadmiernym nagromadzeniem gazów w jelitach: wzdęcia, uczucie pełności, odbijanie*

Osoby powyżej 18 roku życia: 1 kapsułka 2-3 razy w ciągu doby.

### *Przygotowanie do badań diagnostycznych*

W dniu poprzedzającym badanie: 1 kapsułka wieczorem, w dniu badania: 1 kapsułka rano na czczo.

Kapsułki można przyjmować przed posiłkami, po posiłkach i w trakcie posiłków popijając odpowiednią ilością płynu (około 1 szklanka wody).


W przypadku pominięcia dawki nie należy podawać podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Nie przekraczać zalecanej dawki.

Nie stosować wyrobu po upływie terminu ważności.

### **Warunki przechowywania**

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.



**Wyrób medyczny**





Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.  
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

**Logo**

18.05.2017r.

PPF HASCO-LEK S.A. Biuro w Warszawie  
DZIAŁ REJESTRACJI I BADAŃ KLINICZNYCH LEKÓW  
KOORDYNATOR REJESTRACJI

*mgr farm. Teresa Paprocka*



**„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ  
HASCO-LEK” S.A.**  
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

## Instrukcja używania wyrobu medycznego

Należy zapoznać się z treścią instrukcji przed zastosowaniem wyrobu medycznego.  
- Należy zachować instrukcję, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.  
- Jeśli objawy nasiliły się i nie nastąpi poprawa, należy skontaktować się z lekarzem.

## **ULGIX WZDĘCIA MAX** kapsułki miękkie

### **Wyrób medyczny**

#### **Spis treści instrukcji:**

1. Co to jest wyrób medyczny Ulgix Wzdęcia Max i dlaczego się go stosuje
2. Jak stosować wyrób medyczny Ulgix Wzdęcia Max
3. Przeciwwskazania
4. Środki ostrożności i ostrzeżenia
5. Możliwe działania niepożądane
6. Jak przechowywać Ulgix Wzdęcia Max
7. Inne informacje

1 kapsułka żelatynowa wyrobu medycznego Ulgix Wzdęcia Max zawiera:

240 mg symetykonu

Substancje pomocnicze: żelatyna, glicerol, żółcień chinolinowa

#### **1. Co to jest wyrób medyczny Ulgix Wzdęcia Max i dlaczego się go stosuje**

Ulgix Wzdęcia Max zawiera symetykon w wysokiej dawce. Dzięki temu zwiększa się efektywność działania preparatu, co wpływa na skuteczniejsze łagodzenie dolegliwości wywoływanych przez silne wzdęcia.

Symetykon jest stabilną mieszaniną polimeru silikonu i dwutlenku krzemu o właściwościach odpinających i adsorbujących gazy jelitowe. Zalecana dawka symetykonu wywołuje wyłącznie działanie powierzchniowe i jest obojętna dla organizmu. Symetykon nie wchłania się z przewodu pokarmowego, nie powoduje zmiany pH treści pokarmowej, nie zmienia procesów trawiennych i nie zakłóca mechanizmów absorpcji jelitowej. Wydalany jest z organizmu w postaci niezmięnionej. Symetykon posiada zdolność obniżania napięcia powierzchniowego śluzu i pęcherzyków gazów znajdujących się w jelitach. W ten sposób ułatwia ich pękanie i rozbijanie, co usprawnia usuwanie nadmiaru nagromadzonych gazów w przewodzie pokarmowym.

Ulgix Wzdęcia Max stosowany jest w łagodzeniu objawów związanych z nadmiernym nagromadzeniem gazów w żołądku i jelitach, powstałych w wyniku fermentacji jelitowej w czasie procesów trawienia. Należą do nich: uczucie pełności, silne wzdęcia, odbijanie, które mogą być wynikiem m. in. błędów dietetycznych.

Ulgix Wzdęcia Max stosowany jest także pomocniczo przed wykonaniem badań diagnostycznych w obrębie jamy brzusznej techniką obrazową, takich jak: radiografia, ultrasonografia i endoskopia. Przyczynia się do usunięcia z przewodu pokarmowego gazów i powietrza, przez co poprawia jakość uzyskiwanych obrazów i eliminuje trudności diagnostyczne.

## **2. Jak stosować wyrób medyczny Ulgix Wzdęcia Max**

Wyrób medyczny Ulgix Wzdęcia Max w postaci kapsułek żelatynowych stosuje się doustnie.

*Objawy związane z nadmiernym nagromadzeniem gazów w jelitach, takie jak: wzdęcia, uczucie pełności, odbijanie*

Osoby powyżej 18 roku życia: 2-3 kapsułki w ciągu doby.

*Przygotowanie do badań diagnostycznych w obrębie jamy brzusznej*

W dniu poprzedzającym badanie: 1 kapsułka wieczorem, w dniu badania: 1 kapsułka rano na czczo.

Kapsułki można przyjmować przed posiłkami, po posiłkach i w trakcie posiłków popijając odpowiednią ilością płynu (około 1 szklanka wody).

W przypadku pominięcia dawki nie należy podawać podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Nie przekraczać zalecanej dawki.

Nie stosować wyrobu po upływie terminu ważności.

## **3. Przeciwwskazania**

Wyrobu Ulgix Wzdęcia Max nie należy stosować, jeśli występuje nadwrażliwość na symetykon lub inny składnik wyrobu.

## **4. Środki ostrożności i ostrzeżenia**

Stosowanie wyrobu w okresie ciąży i karmienia piersią wymaga konsultacji lekarskiej.

Jeśli dotychczasowe objawy utrzymują się lub nasilają i występują nowe dolegliwości żołądkowo-jelitowe zaleca się konsultację lekarską w celu ustalenia przyczyny i podjęcia leczenia.

Nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji symetykonu z lekami, jednakże z uwagi na prawdopodobieństwo wystąpienia interakcji nie zaleca się jednoczesnego przyjmowania wyrobu medycznego Ulgix Wzdęcia z lekami.

## **5. Możliwe działania niepożądane**

Brak doniesień o znaczących działaniach niepożądanych związanych ze stosowaniem symetykonu. Sporadycznie u niektórych chorych mogą występować bóle brzucha, biegunka, zaparcie.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek działania niepożądane związane ze stosowaniem wyrobu medycznego, należy je zgłosić wytwórcy.

#### **6. Jak przechowywać wyrób medyczny Ulgix Wzdęcia Max**

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25° C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

#### **7. Inne informacje**

Wyrób medyczny Ulgix Wzdęcia Max jest dostępny w opakowaniu zawierającym 15, 30 kapsułek miękkich.

Informacje na opakowaniu jednostkowym



„NUMER SERII”



„UŻYĆ DO”

25°C



„NAJWYŻSZA DOPUSZCZALNA TEMPERATURA”



„ZAJRZYJ DO INSTRUKCJI UŻYWANIA”

**WYRÓB MEDYCZNY**



„WYTWÓRCA”

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.  
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

## Logo

### Informacja o wyrobie medycznym:

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

[www.hasco-lek.pl](http://www.hasco-lek.pl)

tel.: +48 22 742 00 22

Data wydania instrukcji: 20.04.2017 r.

18.05.2017r.

PPF HASCO-LEK S.A. Biuro w Warszawie  
DZIAŁ REJESTRACJI I BADAŃ KLINICZNYCH LEKÓW  
KOORDYNATOR DS. REJESTRACJI

*mgr farm. Teresa Paprocka*